

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Ventoline Diskus

0,2 mg/dos inhalationspulver, avdelad dos / Salbutamol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker någrabiverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. VAD VENTOLINE DISKUS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER VENTOLINE DISKUS
3. HUR DU ANVÄNDER VENTOLINE DISKUS
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR VENTOLINE DISKUS SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD VENTOLINE DISKUS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Ventoline Diskus är ett luftrörsvidgande läkemedel som gör det lättare att andas.

Ventoline Diskus används för symtomlindring vid:

- astma
- kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Ventoline Diskus ska användas för att lindra akuta besvär.

2. INNAN DU ANVÄNDER VENTOLINE DISKUS

Ta inte Ventoline Diskus om:

- du är allergisk (överkänslig) mot salbutamol eller mot något av övriga innehållsämnen i Ventoline Diskus.

Var särskilt försiktig med Ventoline Diskus

Före behandling med Ventoline Diskus påbörjas, rådgör med läkare om du har någon av följande sjukdomar:

- hjärt-kärlsjukdom
- kärlkramp
- ökad sköldkörtelfunktion (hypertyreos)
- tillstånd med minskad kaliumhalt i blodet
- diabetes (sockersjuka)

Om astmabesvären tilltar eller om effekten av Ventoline Diskus försämras, ska man omedelbart kontakta läkare. Upprepade inhalationer som inte ger effekt vid svåra astmaanfall kan betyda att annan behandling behövs.

Sluta att ta Ventoline och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

- svullnad av ansikte, tunga eller svalg
- svårigheter att svälja
- nässelutslag och andningssvårigheter

Intag av andra läkemedel

Effekten av behandlingen kan påverkas om Ventoline Diskus och vissa andra mediciner tas samtidigt. Råd gör därför med läkare före annan samtidig medicinering. Vissa blodtrycksmediciner (beta-blockerare) kan upphäva effekten av Ventoline Diskus.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats vid användning av Ventoline Diskus under graviditeten.

Det är okänt om salbutamol passerar över i modersmjölk. Råd gör därför med läkare före användning under amning.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något innehållsämne i Ventoline Diskus

Ventoline Diskus innehåller laktos i upp till 12,5 mg/dos. Denna mängd orsakar normalt inga problem för laktosintoleranta personer.

3. HUR DU ANVÄNDER VENTOLINE DISKUS

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

Vanlig dos är 1-2 inhalationer vid behov. Se Bruksanvisning för mer information.

Om du har tagit för stor mängd av Ventoline Diskus

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Vid överdosering kan du få ökad hjärtklappning, diarréer och huvudvärk.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Ventoline Diskus orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar indelas i följande kategorier:

mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 person av 10)

vanliga (fler än 1 person av 100)

mindre vanliga (färre än 1 person av 100)

sällsynta (färre än 1 person av 1000)

mycket sällsynta (färre än 1 person av 10 000)

Vanliga: Darrningar. Ökad hjärtfrekvens. Huvudvärk. Muskelkramp.

Mindre vanliga: Hjärtklappning. Irritation i munhåla och svalg.

Sällsynta: Minskad kaliumhalt i blodet. Utvidgning av ytliga blodkärl som kan ge rodnad och värmekänsla i huden.

Mycket sällsynta: Överkänslighetsreaktioner, t ex klåda och hudutslag (nässelfeber) svullnad i ansikte, tunga och/eller svalg (s kängioödem), kramp i luftrören, blodtrycksfall. Överaktivitet och sömnstörningar. Oregelbunden hjärtrytm. Bröstmärta (som tecken på kärlkramp).*

* Om bröstsmärta (som tecken på kärlkramp) skulle inträffa bör du tala med din läkare så snart som möjligt. Avbryt dock inte behandlingen på egen hand.

Inhalationsbehandling kan genom ej klarlagda mekanismer ge upphov till kramp i luftrören.

Darrningar och hjärtklappning kan förekomma, speciellt i början av behandlingen. Dessa brukar försvinna efter en viss tids användning.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker någrabiverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR VENTOLINE DISKUS SKA FÖRVARAS

- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
- Förvaras vid högst 30°C.
- Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. Eftersom läkemedelsrester kan finnas kvar i de tomma förpackningarna bör man inte kasta dessa i soporna utan även de tomma förpackningarna bör återlämnas till apotek.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i Ventoline Diskus är salbutamol. Varje dosinnehåller 0,2 mg salbutamol (som salbutamolsulfat), laktosmonohydrat 12,5 mg.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ventoline Diskus är en formgjuten (blå) plastinhalator, i vilken inhalationspulvret ligger förpackat i avdelade blisterdoser i en folieremsa.

Ventoline Diskus är förpackad i kartonger i förpackningsstorlekarna 1x60 doser eller 3x60 doser.

Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna

Tel: 08-638 93 00

E-post: info.produkt@gsk.com

Denna bipacksedel godkändes senast den 2009-01-21

Bruksanvisning

Läs noggrant igenom bruksanvisningen, innan du använder VentolineDiskus.

STÄNGD



Ytterhölje

Tumgrepp (för att öppna och stänga inhalatorn)

Inhalatorn öppnas i den här riktningen

ÖPPEN



Ytterhölje

Munstycke

Frammatningsspak

Tumgrepp

Dosräknare
Full 60

Dosräknaren anger hur
mångadoser som finns

Tom 0

kvar. Siffrorna 5 till 0 är markerade med RÖTT, för att varna när inhalatorn snart är tom.

1. ÖPPNA

Fatta tag om inhalatorn som på bilden och för tumgreppet i pilens riktning så långt det går.



2. MATA FRAM

Håll inhalatorn med munstycket mot dig. För frammatningsspaken från dig, så långt det går - tills ett klick hörs.

Ventoline Diskus är nu klar att användas.



3. INHALERA

- Gör en normal utandning.
OBS! Andas aldrig ut genom inhalatorn.
- För därefter inhalatorn till munnen och slut läpparna om munstycket. Andas in djupt genom munnen
- Tag bort inhalatorn
- Håll andan 5-10 sekunder
- Andas ut



4. STÄNG

Du stänger inhalatorn genom att föra tumgreppet mot dig så långt det går.

Ett klicks hörs när inhalatorn stängs.

Frammatningsspaken har nu automatiskt återgått till sitt ursprungsläge.

Inhalatorn är klar att användas på nytt.



KOM IHÅG

Förvara inhalatorn vid högst 30°C

Förvara inhalatorn stängd

Andas aldrig ut genom inhalatorn

*Rör endast frammatningsspaken, när du ska inhalera
Behöver ej rengöras
Överskrid ej ordinerad dosering*

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn